

TALVEY® (TALQUETAMAB)

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.

Carte patient

Portez toujours cette carte sur vous.

Présentez cette carte à chaque professionnel de santé qui est impliqué dans vos soins et lorsque vous vous rendez à l'hôpital.

TALVEY peut provoquer des effets secondaires tels que le syndrome de relargage des cytokines (SRC) et des effets secondaires neurologiques, y compris le syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices immunitaires (ICANS).

Nom du patient:

Informations de sécurité importantes pour les patients

Si vous présentez l'un des symptômes suivants, consultez immédiatement un médecin :

Syndrome de relargage des cytokines (SRC)

- Faible tension artérielle
- Frissons
- Difficultés à respirer
- Fatigue
- Maux de tête
- Accélération du rythme cardiaque
- Augmentation du taux d'enzymes hépatiques dans le sang

Effets secondaires neurologiques, y compris d'ICANS

- Sensation de confusion
- Sensation de moindre vigilance
- Sensation de désorientation
- Sensation de somnolence
- Ralentissement ou des difficultés à réfléchir
- Réflexion altérée ou baisse du niveau de conscience
- Confusion
- Difficultés à parler et à comprendre un discours

Important à retenir

Restez à proximité de l'endroit où vous avez reçu votre traitement par TALVEY pendant au moins 2 jours pour un suivi quotidien après l'administration de toutes les doses du schéma posologique de démarrage.

Si vous présentez **l'un** des symptômes répertoriés sur cette carte, contactez immédiatement votre médecin traitant ou appelez immédiatement un médecin !

Ce ne sont pas là tous les effets secondaires possibles de TALVEY. Informez votre médecin si vous présentez un effet secondaire qui vous gêne ou qui ne disparaît pas.

MÉDECIN TRAITANT

nom : _____

numéro de téléphone : _____

HÔPITAL

nom : _____

adresse : _____

numéro de téléphone : _____

Informations à remplir par l'équipe soignante

Remettez cette carte à votre équipe soignante afin qu'elle puisse la remplir et vous la retourner.

Données des injections de TALVEY (schéma d'escalade de dose) :

dose 1 de la période d'escalade _____

dose 2 de la période d'escalade _____

dose 3 de la période d'escalade _____

dose 4 de la période d'escalade* _____

période de traitement† _____

* Pour la dose toutes les deux semaines uniquement.

† Pour la dose hebdomadaire, il s'agit de : 0,4 mg/kg par la suite une fois par semaine. Pour la dose toutes les deux semaines, il s'agit de : 0,8 mg/kg une fois toutes les 2 semaines par la suite.

Informations de sécurité importantes pour le personnel soignant

Le SRC et des toxicités neurologiques, dont l'ICANS, peuvent survenir chez les patients recevant TALVEY, et peuvent être fatals ou engager le pronostic vital. La majorité de ces événements observés après l'administration de TALVEY étaient de grade 1 et 2.

Évaluez le patient pour détecter les signes et symptômes du SRC et de l'ICANS.

Si votre patient présente des signes ou des symptômes repris sur cette carte, contactez immédiatement son médecin traitant pour plus d'informations.

Pour plus d'informations, reportez-vous au résumé des caractéristiques du produit.