

Patiëntenkaart Yuvanci

Pagina 5

Als u een van deze klachten heeft: vertel dit onmiddellijk aan uw arts. Heeft u een vraag over uw behandeling? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Pagina 6

Belangrijk: meld zwangerschap of bijwerkingen die u krijgt tijdens de behandeling met Yuvanci onmiddellijk aan de arts van wie u Yuvanci heeft gekregen.

Behandelcentrum:


Naam voorschrijvend arts:

Telefoonnummer van de voorschrijvend arts:

MU_123532194



Pagina 1

 **10 mg / 20 mg**
10 mg / 40 mg

filmomhulde tabletten
macitentan/tadalafil
Voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie

NI Op deze kaart staat belangrijke veiligheidsinformatie. U moet dit weten als u Yuvanci gebruikt.

Draag deze kaart altijd bij u. Laat hem zien aan elke arts van wie u medische zorg krijgt.

Pagina 2

Zwangerschap

Yuvanci kan slecht zijn voor de ontwikkeling van de ongeboren baby. Daarom mag u Yuvanci niet innemen als u zwanger bent. U mag ook niet zwanger worden zolang u Yuvanci gebruikt. Bovendien kan een zwangerschap bij pulmonale arteriële hypertensie de klachten van uw ziekte veel erger maken.

Voorbehoedsmiddelen (anticonceptie)

U moet een betrouwbare vorm van voorbehoedsmiddelen gebruiken zolang u Yuvanci gebruikt. Bespreek eventuele vragen zeker met uw arts.

Pagina 3

U moet een zwangerschapstest doen voordat u begint met Yuvanci. Daarna ook elke maand tijdens de behandeling. Zelfs als u denkt dat u niet zwanger bent.

Net als andere medicijnen van dezelfde soort kan Yuvanci invloed hebben op de lever. Uw arts doet bloedonderzoek voordat u begint met de behandeling met Yuvanci en tijdens de behandeling. Dit is om te controleren of uw lever goed werkt.

Pagina 4

Tekenen dat uw lever niet goed werkt, zijn onder andere:

- misselijk zijn (neiging tot overgeven)
- overgeven (braken)
- koorts (hoge temperatuur)
- pijn in uw buik
- geelzucht (geel worden van uw huid of het wit van uw ogen)
- donkere urine
- jeukende huid
- geen fut hebben of moe zijn (ongewone moeheid of uitputting)
- griepachtige klachten (pijn in gewrichten en spieren met koorts)